

**HARMONISCHE MAASSFORMEN UND DIE BOL-IDENTITÄT ([3], S. 30–31, [1], S. 90–92)**

Wir wählen ein  $k \in \mathbb{N}$ . Im siebten Vortrag betrachteten wir den Differentialoperator  $\xi_{2-k}$ , der den Raum der harmonischen Maassformen vom Gewicht  $2 - k$  in den Raum der Spitzenformen vom Gewicht  $k$  abbildet. Eine *schwach holomorphe Modulform* ist eine harmonische Maassform, deren nicht-holomorpher Anteil verschwindet. In Ihrem Vortrag sollen Sie einen weiteren Differentialoperator  $D^{k-1}$  auf dem Raum der harmonischen Maassformen vom Gewicht  $2 - k$  einführen, der aber in den Raum der schwach holomorphen Modulformen abbildet. Wir definieren die Operatoren ( $\tau = u + iv \in \mathbb{H}$ ,  $u, v \in \mathbb{R}$ ,  $v > 0$ ):

$$D = \frac{1}{2\pi i} \frac{\partial}{\partial \tau},$$

$$R_{2-k} = 2i \frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{2-k}{v} = -4\pi D + \frac{2-k}{v},$$

$$R_{2-k}^n = R_{2n-k} \circ \cdots \circ R_{4-k} R_{2-k}.$$

Der Operator  $R_{2-k}$  ist ein sogenannter *Maass-Differentialoperator*. Zeigen Sie nun (s. [1], S. 90–92), dass für  $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  gilt:

$$(R_{2-k}(f)) \Big|_{4-k} \gamma = R_{2-k} \left( f \Big|_{2-k} \gamma \right),$$

d.h.  $R_{2-k}$  bildet Funktionen, die dem modularen Transformationsgesetz vom Gewicht  $2 - k$  gehorchen, in den Raum der Funktionen ab, die das Transformationsgesetz vom Gewicht  $4 - k$  erfüllen. Beweisen Sie nun Lemma 7.7 aus [3]:

**Lemma 1** (Bol-Identität). *Es gilt*

$$D^{k-1} = \frac{1}{(-4\pi)^{k-1}} R_{2-k}^{k-1}.$$

Zeigen Sie hierzu zunächst per Induktion (s. [2], S. 249–250)

$$R_{2-k}^n = (-4\pi)^n \sum_{0 \leq m \leq n} \frac{n!}{(n-m)!} \binom{n-k}{m} \left( -\frac{1}{4\pi v} \right)^m D^{n-m}.$$

Benutzen Sie schließlich Lemma 1, um folgenden Satz zu beweisen:

**Satz 2** (Theorem 7.6 of [3]). *Der Operator  $D^{k-1}$  bildet den Raum der harmonischen schwachen Maassformen vom Gewicht  $2 - k$  in den Raum der schwach holomorphen Modulformen vom Gewicht  $k$  ab.*

LITERATUR

- [1] D. Goldfeld, J. Hundley, *Automorphic representations and L-functions for the general linear group*, Cambridge studies in advanced mathematics **129**, 2011, 1–550.
- [2] J. Lewis, D. Zagier, *Period functions for Maass wave forms, I*, Ann. of Math. **153** (2001) 191–258.
- [3] K. Ono, *Unearthing the visions of a master: harmonic Maass forms and number theory*, in Proceedings of the 2008 Harvard-MIT current developments in mathematics conference, International Press, Somerville, MA, 2009, 374–454.