

Variationsungleichungen

2. Übung

Abgabe: Freitag, 19.10.2013, bis 12:15 Uhr

(in den Briefkasten für Übungsblätter im “MI-Container” auf dem Parkplatz der Physik)

Aufgabe 1:

Es sei $K \subset \mathbb{R}^2$ eine abgeschlossene, konvexe, beschränkte Menge, und P_K die Projektion auf K . Ferner sei S der Rand einer Kreisscheibe, die K enthält, und $\gamma : [0, 2\pi) \rightarrow S$ die Standardparametrisierung von S in Polarkoordinaten bezüglich des Kreismittelpunkts. Zeigen Sie, dass die stetige Kurve $\eta = P_K \circ \gamma : [0, 2\pi) \rightarrow \partial K$ rektifizierbar ist, d.h., die Länge

$$L := \sup \left\{ \sum_{i=1}^m |\eta(t_i) - \eta(t_{i-1})| \mid m \in \mathbb{N}, 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = 2\pi \right\}$$

der Kurve η (also der Umfang von K) ist endlich. Hier bezeichnet $|\cdot|$ die euklidische Norm eines Vektors im $\mathbb{R}^2$.

(5 Punkte)

Aufgabe 2:

Es seien $K_2 \subset K_1 \subset \mathbb{R}^2$ abgeschlossene, konvexe, beschränkte Mengen. Zeigen Sie, dass der Umfang von K_1 (im Sinne von Aufgabe 1) mindestens so groß ist wie der von K_2 .

(5 Punkte)

Aufgabe 3:

Finden Sie ein Beispiel einer stetigen Abbildung $F : K \rightarrow (\mathbb{R}^N)'$, mit einer geeigneten konvexen und abgeschlossenen Menge $K \subset \mathbb{R}^N$, für die die Variationsungleichung

$$\langle F(x), y - x \rangle \geq 0 \quad \text{für alle } y \in K$$

mehr als eine Lösung $x \in K$ hat.

(5 Punkte)

Aufgabe 4:

Es seien $K_2 \subset K_1 \subset \mathbb{R}^N$ abgeschlossene, konvexe Mengen (die aber nicht beschränkt sein müssen), und $F : K_1 \rightarrow (\mathbb{R}^N)'$ stetig und strikt monoton. Ferner nehmen wir an, dass zwei Lösungen $x_j \in K_j$, $j = 1, 2$, von

$$\langle F(x_j), y - x_j \rangle \geq 0 \quad \text{für alle } y \in K_j$$

existieren. Zeigen Sie:

- (a) Ist $F(x_2) = 0$, so folgt $x_1 = x_2$.
- (b) Ist $F(x_2) \neq 0$ und $x_1 \neq x_2$, so liegen x_1 und K_2 auf verschiedenen Seiten der Hyperfläche

$$H := \{y \in \mathbb{R}^N \mid \langle F(x_2), y - x_2 \rangle = 0\}.$$

Genauer gesagt gilt

$$\langle F(x_2), x_1 - x_2 \rangle < 0 \leq \langle F(x_2), y - x_2 \rangle \quad \text{für alle } y \in K_2.$$

(5 Punkte)

Informationen zur Vorlesung und den Übungen gibt es auf der **Veranstaltungshomepage** (auf der Internetseite des Lehrstuhls Kawohl verlinkt unter "Lehre"):

<http://www.mi.uni-koeln.de/mi/Forschung/Kawohl/1213WS/varungl.html>