

## Variationsungleichungen

### 7. Übung

**Abgabe: Freitag, 23.11.2013, bis 12:15 Uhr**

(in den Briefkasten für Übungsblätter im "MI-Container" auf dem Parkplatz der Physik)

#### Aufgabe 1:

Es sei  $1 \leq p < N$ . Zu  $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$  definieren wir

$$u_\lambda(x) := \lambda^\alpha u(\lambda x), \quad x \in \mathbb{R}^N, \quad \lambda > 0,$$

mit derjenigen Konstanten  $\alpha \in \mathbb{R}$ , für die

$$\|\nabla u_\lambda\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} = \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \quad \text{für alle } \lambda > 0 \text{ und alle } u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N).$$

- (a) Berechnen Sie  $\alpha = \alpha(p, N)$  explizit.
- (b) Bestimmen Sie  $q \in [1, \infty)$ , so dass

$$\|u_\lambda\|_{L^q(\mathbb{R}^N)} = \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^N)} \quad \text{für alle } \lambda > 0 \text{ und alle } u \in L^q(\mathbb{R}^N).$$

- (c) Sei nun  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  ein beschränktes Gebiet mit glattem Rand und  $q$  die Zahl aus (b). Finden Sie eine in  $H_0^{1,p}(\Omega)$  und  $L^q(\Omega)$  beschränkte Folge  $(u_n)$ , die in  $L^q(\Omega)$  keine konvergente Teilfolge hat (z.B. weil  $u_n \rightarrow 0$  punktweise f.ü. und  $\liminf \|u_n\|_{L^q} > 0$ ).

(5 Punkte)

#### Aufgabe 2:

Es sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  ein beschränktes Gebiet,  $f_0 \in L^s(\Omega)$  mit einem  $s > N$ ,  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und beschränkt mit  $tg(t) \geq 0$  für alle  $t \in \mathbb{R}$  und  $u \in H_0^1(\Omega)$  eine schwache Lösung von  $-\Delta u + g(u) = f_0$ , also

$$\int_{\Omega} (u_{x_i} \varphi_{x_i} + g(u)\varphi - f_0 \varphi) dx = 0 \quad \text{für alle } \varphi \in H_0^1(\Omega)$$

Zeigen Sie, dass dann  $\max_{\Omega} |u| \leq C$  mit einer von  $g$  und  $u$  unabhängigen Konstanten  $C \geq 0$ .

Hinweis: Für  $k > 0$  sei

$$u^{(k)} := (\text{sgn } u) \max\{|u| - k, 0\}, \quad A(k) := \{x \in \Omega : |u(x)| \geq k\}.$$

Nach der Vorlesung genügt es zu zeigen (warum?), dass

$$\|u^{(k)}\|_{H_0^1(\Omega)}^2 \leq C_1 \int_{A(k)} f_0^2 dx$$

mit einer von  $u$ ,  $k$  und  $g$  unabhängigen Konstanten  $C_1 \geq 0$ .

(5 Punkte)

**Aufgabe 3:**

Es sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  ein beschränktes Gebiet mit glattem Rand. Wir betrachten das Funktional

$$J(u) := \int_{\Omega} \left( |\nabla u|^2 + |\nabla u| - au \right) dx, \quad u \in H_0^1(\Omega),$$

mit gegebenem  $a \in L^2(\Omega)$ , wobei  $\nabla u = (\partial_1 u, \dots, \partial_N u)$  der Vektor der schwachen Ableitungen erster Ordnung und  $|\cdot|$  die euklidische Norm im  $\mathbb{R}^N$  ist. Zeigen Sie:

(a) Ist  $u$  ein Minimierer, so gilt die Variationsungleichung

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot (\nabla v - \nabla u) + |\nabla v| - |\nabla u| - a(v - u)) dx \geq 0 \quad \text{für alle } v \in H_0^1(\Omega).$$

(b)  $J : H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  ist strikt konvex, und hat höchstens einen Minimierer.

(c) Die Variationsungleichung aus (a) hat höchstens eine Lösung  $u \in H_0^1(\Omega)$ .

(5 Punkte)

**Aufgabe 4:**

Es sei  $\omega : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige und monoton wachsende Funktion, so dass

$$0 \leq \omega(\rho) \leq \eta \omega(4\rho) + C \left( \frac{\rho}{R} \right)^\alpha \quad \text{für alle } 0 \leq \rho \leq \frac{R}{4}, \quad (1)$$

wobei  $C \geq 0$ ,  $0 < \eta < 1$  und  $0 < \alpha < \left| \frac{\log \eta}{\log 4} \right|$  Konstanten sind. Zeigen Sie, dass dann

$$\omega(\tilde{\rho}) \leq 2 \max\{\omega(R), CK\} \left( \frac{4\tilde{\rho}}{R} \right)^\alpha \quad \text{für alle } 0 \leq \tilde{\rho} \leq \frac{R}{4} \quad (2)$$

gilt, mit einer Konstanten  $K \in \mathbb{R}$ .

Hinweis: Zeigen Sie zunächst induktiv, dass ein  $K$  existiert, so dass

$$\omega(4^{-n}\rho) \leq \eta^n \omega(\rho) + CK \left( \frac{4^{-n}\rho}{R} \right)^\alpha \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ und alle } 0 \leq \rho \leq R. \quad (3)$$

Um die rechte Seite von (3) weiter nach oben abzuschätzen, überlegen Sie sich dann, dass  $\omega(\rho) \leq \omega(R)$ , und dass für alle  $\tilde{\rho} = 4^{-n}\rho \in [4^{-(n+1)}R, 4^{-n}R]$  folgende Ungleichung gilt:

$$\eta^{n+1} \leq \eta^q \leq \eta^n, \quad \text{wobei } q := \frac{\log(R/\tilde{\rho})}{\log 4}.$$

Bemerkung: Für die Voraussetzung (1) ist die Annahme einer oberen Schranke für  $\alpha$  keine echte Einschränkung, denn gilt (1) für ein  $\alpha > 0$ , so auch für alle kleineren. Die Aussage (2) ist jedoch falsch im Fall  $\alpha = \left| \frac{\log \eta}{\log 4} \right|$ , z.B.  $\omega(\rho) := \rho^\alpha (-\log \rho)$  für  $0 \leq \rho \leq 1$ .

(5 Punkte)

Informationen zur Vorlesung und den Übungen gibt es auf der **Veranstaltungshomepage** (auf der Internetseite des Lehrstuhls Kawohl verlinkt unter "Lehre"):

<http://www.mi.uni-koeln.de/mi/Forschung/Kawohl/1213WS/varungl.html>