REGRESSIONSANALYSE

DAVID BUCHATZ
UNIVERSITÄT ZU KÖLN

AUFBAU

- §1 Historie
- §2 Anwendungen / Ziele
- §3 Lineare Regression/ Beispiel KQ
- §4 Nichtlineare Regression
- §5 Eigenschaften der Schätzer

Historie

- früheste Form der Regression Methode der kleinsten Quadrate (frz.: *méthode des moindres carrés*), 1805 von Legendre und 1809 von Gauß veröffentlicht
- Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne anhand von astronomischen Beobachtungen zu bestimmen

DATENPUNKTWOLKE

Reingewinn

UNSER ZIEL

Reingewinn

- 1 Unternehmen
- 10 verschiedene Filialen
- Einheitliches Konzept außer Aktionen & Rabatte
- Herr Uli Hoeneß stellt sich nun die Frage :

Wächst der Reingewinn bei Filialen mit größeren Umsätzen auch stetig an , oder verringert sich der Reingewinn bei höherem Umsatz durch irgendwelche Faktoren, die man dann untersuchen müsste (z.B. kleinere Gewinnmarge an Produkten und eventuell höhere Kosten, bzw. falsches Management) ?

ANWENDUNGEN

- Regressionsverfahren haben viele praktische Anwendungen
- Prognose oder Vorhersage
- Stärke des Zusammenhangs
- Wenn nun zusätzliche Werte x ohne zugehörigen Wert y vorliegen, dann kann das angepasste Modell zur Vorhersage des Wertes von y verwendet werden.

SCHEMA EINER REGRESSIONSANALYSE

- Am **Beginn** jedes statistischen Verfahrens steht die **Aufbereitung der Daten**, insbesondere :
- **Plausibilisierung**
- der Umgang mit **fehlenden Daten**.

linearen Regression

linearer Zusammenhang sowie **Homoskedastizität** wird vorausgesetzt.

Homoskedastizität

Heteroskedastizität

-
- die Berücksichtigung von **Interaktionen** (bei linearer Regression)
 - *Untersuchung der Daten auf **Ausreisser** und **einflussreiche Datenpunkte***

MATHEMATISCHE FORMULIERUNG

■ Beziehung zwischen den unabhängigen Variablen x und der abhängigen Variable y :

■ $y = f(x) + e$ im 1-dimensionalen Fall

■ $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + e$ im n -dimensionalen Fall

■ f die gesuchte oder angenommene Funktion

■ e den Fehler bzw. das Residuum des Modells

LINEARE REGRESSION

- lineare Regression Modell so spezifiziert, dass abhängige Variable y als Linearkombination der Parameter (= Regressionskoeffizient) $\beta_{\downarrow i}$ dargestellt wird , und nicht von der unabhängigen Variablen x .
- Zur Bestimmung der Modellparameter $\beta_{\downarrow i}$ wird die Methode der kleinsten Quadrate eingesetzt.

HERLEITUNG UND VERFAHREN

- Eine einfache Modellfunktion mit zwei linearen Parametern stellt das Polynom erster Ordnung

$$f(x) = \beta_{\downarrow 0} + \beta_{\downarrow 1} * x$$

- zu n gegebenen Messwerten $(x_{\downarrow 1}, y_{\downarrow 1}), \dots, (x_{\downarrow n}, y_{\downarrow n})$ die Koeffizienten $\beta_{\downarrow 0}$ und $\beta_{\downarrow 1}$ der bestangepassten Gerade

- Die **Abweichungen** $r_{\downarrow i}$ zwischen der gesuchten Geraden und den jeweiligen Messwerten

$$\begin{aligned} r_{\downarrow 1} &= \beta_{\downarrow 0} + \beta_{\downarrow 1} x_{\downarrow 1} - y_{\downarrow 1} \\ r_{\downarrow 2} &= \beta_{\downarrow 0} + \beta_{\downarrow 1} x_{\downarrow 2} - y_{\downarrow 2} \\ &\dots \\ r_{\downarrow n} &= \beta_{\downarrow 0} + \beta_{\downarrow 1} x_{\downarrow n} - y_{\downarrow n} \end{aligned}$$

nennt man **Anpassungsfehler** oder **Residuen**.

Gesucht sind nun die Koeffizienten $\beta_{\downarrow 0}$ und $\beta_{\downarrow 1}$ mit der **kleinsten Summe der Fehlerquadrate**.

$$\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_{i=1}^n (r_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

- Vorteil des Ansatzes Quadrat der Fehler wird sichtbar, wenn man Minimierung mathematisch durchführt :
Die Summenfunktion wird als Funktion der beiden Variablen β_0 und β_1 aufgefasst
- Dann partielle Ableitung mit folgendem LGS

$$n \cdot \beta_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \beta_1 = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \beta_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \cdot \beta_1 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Nullstelle suchen (Minimum)

Mit der Lösung

$$\beta_1 = (\sum_{i=1}^n x_i y_i) - n * (x y) / (\sum_{i=1}^n x_i^2) - n * (x)^2$$

und

$$\beta_0 = y - \beta_1 x$$

Dabei ist

$$\bar{x} = 1/n * \sum_{i=1}^n x_i$$

das arithmetische Mittel der x-Werte, y entsprechend

- Die Lösung für β_1 kann mit Hilfe des Verschiebungssatzes auch als

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

angegeben werden.

BERECHNUNG DER PARAMETER

Nummer	Umsatz	Reingewinn	$x_{li} - x$	$y_{li} - y$			
i	x_{li}	y_{li}	$x_{li} \uparrow *$	$y_{li} \uparrow *$	$x_{li} \uparrow * \cdot y_{li} \uparrow *$	$x_{li} \uparrow * \cdot x_{li} \uparrow *$	$y_{li} \uparrow * \cdot y_{li} \uparrow *$
1	208	21,6	40,2	3,19	128,238	1616,04	10,1761
2	152	15,5	-15,8	-2,91	45,978	249,64	8,4681
3	113	10,4	-54,8	-8,01	438,948	3003,04	64,1601
4	227	31,0	59,2	12,59	745,328	3504,64	158,5081
5	137	13,0	-30,8	-5,41	166,628	948,64	29,2681
6	238	32,4	70,2	13,99	982,098	4928,04	195,7201
7	178	19,0	10,2	0,59	6,018	104,04	0,3481
8	104	10,4	-63,8	-8,01	511,038	4070,44	64,1601
9	191	19,0	23,2	0,59	13,688	538,24	0,3481
10	130	11,8	-37,8	-6,61	249,858	1428,84	43,6921
Σ	1678	184,1	0,0	0,00	3287,820	20391,60	574,8490

Dann bestimmt man β_1 :

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 3287,820 / 20391,60 = \mathbf{0,1612}$$

mit jeder Millionen € Umsatz wächst Reingewinn im Durchschnitt etwa **0,16 Mio. €**

Das Absolutglied β_0 ergibt sich als :

$$\beta_0 = y - \beta_1 x = 18,41 - 0,1612 * 167,8 = -8,6451$$

Reingewinn

-
- Anpassung der Punkte recht gut
 - Im Mittel beträgt die Abweichung 2,1 Mio. €
 - Bestimmtheitsmaß ergibt einen Wert von ca. 92%

■ **Bestimmtheitsmaß** (auch **Determinationskoeffizient**) Maß in der Statistik für den erklärten Anteil der Variabilität (Varianz) einer abhängigen Variablen durch ein statistisches Modell.

■ Indirekt Zusammenhang zwischen der abhängigen und den unabhängigen Variablen

■ 0 (oder 0 %): kein linearer Zusammenhang und

■ 1 (oder 100 %): perfekter linearer Zusammenhang.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{li}^2}{\sum_{i=1}^n (y_{li} - \bar{y})^2}$$

RESIDUEN

Reingewinn

Reingewinn

WARUM SUMME DER FEHLERQUADRATE ?

- das Vorzeichenproblem der Residuen hat man damit gelöst
- Die Summe der Residuen – Quadrate ist minimal (per Extremwertproblem gelöst)
- Bei jeder anderen Gerade wären vielleicht einzelne Residuen-Quadrate kleiner
- Jedoch Summe dieser Residuen-Quadrate größer als bei der eben ermittelten Geraden

- Allgemeiner als eine lineare Ausgleichsgerade sind Ausgleichspolynome

- $$y(x) \approx \beta_{\downarrow 0} + \beta_{\downarrow 1} * x + \beta_{\downarrow 2} * x^2 + \dots + \beta_{\downarrow q} x^{\uparrow q}$$

- Lineare Regression, da man die einzelnen $\beta_{\downarrow i}$ bestimmen will

BEISPIEL POLYNOM 2. GRADES

Reingewinn

BEISPIEL POLYNOM 6. GRADES

NICHTLINEARE MODELLFUNKTIONEN

- leistungsfähige Rechner ermöglichen nichtlineare Regression
- Nichtlineare Modellierung ermöglicht Anpassung von Daten an jede Gleichung

- $y = f(\beta \downarrow i)$

„curve fitting“

Manche nichtlineare Probleme durch geeignete Substitution in lineare überführen

multiplikatives Modell in der Form wie

$$y = \beta_0 * x^{\beta_1}$$

lässt sich beispielsweise durch Logarithmieren in ein additives System überführen.

Dieser Ansatz findet unter Anderem in der Wachstumstheorie Anwendung.

Reingewinn

EIGENSCHAFTEN DER SCHÄTZER

- Seien $X_1, X_2, \dots, X_n$ eine Zufallsstichprobe der Größe n
- $\hat{\theta}_n$ ein Schätzer auf Basis dieser Stichprobe und θ der wahre Parameter

UNVERZERRHEIT / ERWARTUNGSTREUE

unverzerrt / erwartungstreu (engl. : unbiased), wenn gilt :

$$E(\theta \downarrow n) = \theta$$

Weicht $E(\theta \downarrow n)$ von θ ab, dann verzerrt

Verzerrung $\text{Bias}(\theta \downarrow n)$

$$\text{Bias}(\theta \downarrow n) = E(\theta \downarrow n) - \theta$$

asymptotische erwartungstreu Schätzfunktion muss nur gelten :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\theta \downarrow n) = \theta$$

KONSISTENZ / ASYMPTOTISCHE ERWARTUNGSTREUE

- Schätzer $\theta \downarrow n$ von θ ist konsistent / asymptotisch erwartungstreu (engl. : consistent), wenn für $\delta > 0$ gilt :

$$P (|\theta \downarrow n - \theta| > \delta) \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

- stochastische Konvergenz
- Mit einfachen Worten : Eine konsistente Schätzfunktion nähert sich mit wachsendem n immer mehr dem wahren Parameter θ an (schätzt den wahren Parameter immer genauer)
- Konsistente Schätzfunktionen müssen daher **mindestens** asymptotisch erwartungstreu sein

- Wahrscheinlichkeitsdichten für die konsistenten Schätzfunktionen $\theta \downarrow n$ ($n=100, 178, 400$).
- Mit steigendem Stichprobenumfang wird der unbekannte Parameter θ immer genauer geschätzt.

MINIMALE VARIANZ , EFFIZIENZ

- Die Schätzfunktion soll eine möglichst kleine Varianz haben
- effiziente, beste oder wirksamste Schätzfunktion

$$\text{Var}(\theta \downarrow n^*) \leq \min_{\tau \theta \downarrow n} \text{Var}(\theta \downarrow n)$$

MITTLERER QUADRATISCHER FEHLER

- Die Genauigkeit einer Schätzfunktion bzw. eines Schätzers wird oft durch seinen mittleren quadratischen Fehler (engl.: *mean squared error*) ausgedrückt
- möglichst kleinen mittleren quadratischen Fehler

$$\text{MSE}(\theta \downarrow n) = E [(\theta \downarrow n - \theta)^2] = (\text{Bias}(\theta \downarrow n))^2 + \text{Var}(\theta \downarrow n)$$

Prognosen → Sinn?

Reingewinn

$$y = 0,1612x - 8,6451$$
$$R^2 = 0,9222$$

Reingewinn

Reingewinn

Reingewinn