
Übungsblatt Nr. 2

Abgabe am 31.10.2001 vor den Übungen

Aufgabe 1 (4 Punkte):

Geben Sie jeweils die erste Ableitung an:

(a) $f_1(x) = \sqrt{3x^2 + 5}$

(b) $f_2(x) = \exp(-x^2)$

(c) $f_3(x) = -x^2 \exp(x)$

(d) $f_4(x) = \sin(1/x)$ (Falls die Ableitung von $\sin(x)$ nicht bekannt ist, so schlage man sie nach.)

Aufgabe 2 (4 Punkte):

Ein Virus bricht aufgrund der Inkubationszeit bei einem Kollektiv infizierter Patienten, die sich alle zum Zeitpunkt $t = 0$ angesteckt haben, erst zu einem späterem Zeitpunkt $t > 0$ aus. Für den Anteil $y(t)$ der Patienten, bei denen der Virus noch nicht ausgebrochen ist, gilt nach einem Modell

$$y(t) = \exp\left(-\frac{1}{2}at^2\right) \quad (1)$$

mit einer von der Krankheit abhängigen Konstante $a > 0$.

- (a) Zeichnen Sie $y(t)$ für $0 \leq t \leq 5$ und $a = 1$ in ein Koordinatensystem.
- (b) Stellen Sie eine Formel auf für den Anteil der Patienten, bei denen der Virus ausgebrochen ist.
- (c) Zu welchem Zeitpunkt haben wenigstens 75% der Patienten erste Anzeichen der Krankheit, wenn $a = 1$ gilt? (Hierzu darf die Skizze aus (a) zu Rate gezogen werden.)
- (d) Zur Bestimmung von a für einen bestimmten Virustyp werden Probanden mit dem Virus infiziert. Zum Zeitpunkt $t = 1$ sind bereits bei 50% des Kollektivs erste Anzeichen der Krankheit erkennbar. Wie lautet die richtige Wahl von a ?

Aufgabe 3 (vorrechnen):

Nach dem n -ten Tag genügt die Konzentration x_n eines Medikamentes im Körper eines Patienten der Relation

$$x_{n+1} = qx_n + 4, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

Hierbei sei $q > 0$ angenommen.

- (a) Bestimmen Sie q , falls die Konzentration nach 2 Tagen 8.8 und nach 4 Tagen 5.152 beträgt.
- (b) Wie groß war die Anfangskonzentration x_0 ?
- (c) Konvergiert die Folge x_n ? Wenn ja, gegen welchen Wert? (Die Antwort sollte ausreichend begründet sein, ein formaler Beweis ist nicht zwingend notwendig.) Was bedeutet dieses Ergebnis für das Modell?

Aufgabe 4 (vorrechnen):

Betrachten Sie die Differentialgleichung

$$\frac{d}{dt}N(t) = \beta N(t) + \gamma. \quad (3)$$

Hierbei seien $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$. Zeigen Sie: Die Funktion

$$N(t) = \left(C + \frac{\gamma}{\beta}\right) \exp(\beta t) - \frac{\gamma}{\beta} \quad (4)$$

ist für jedes beliebige $C \in \mathbb{R}$ Lösung obiger Differentialgleichung mit Anfangswert $N(0) = C$. Was kann man über das Verhalten der Lösung für $t \rightarrow \infty$ aussagen? Wie könnte man die Differentialgleichung in Bezug auf das Modell einer Bakterienkultur interpretieren?