Lösungshinweise zur 9. Übung

<http://www.mi.uni-koeln.de/~mkurth/biologie>

Aufgabe 1

Berechnen Sie mittels partieller Integration die folgenden Integrale

(i)

$$\int_1^2 x^3 \ln(x^2) dx ,$$

Lösung

Da für die Ableitung vom $\ln$ gilt $\ln'(x) = 1/x$ ist es sinnvoll, die Formel für die partielle Integration mit $v(x) = \ln(x^2)$ und $u'(x) = x^3$ anzuwenden. Es gilt

$$v'(x) = \frac{1}{x^2} \cdot 2x = \frac{2}{x} \quad \text{und} \quad u(x) = \frac{1}{4}x^4 ,$$

also

$$\begin{aligned} \int_1^2 x^3 \ln(x^2) dx &= \frac{1}{4}x^4 \ln(x^2) \Big|_{x=1}^{x=2} - \int_1^2 \frac{1}{4}x^4 \cdot \frac{2}{x} dx = \frac{1}{4}x^4 \ln(x^2) \Big|_{x=1}^{x=2} - \int_1^2 \frac{1}{2}x^3 dx \\ &= \frac{1}{4}x^4 \ln(x^2) \Big|_{x=1}^{x=2} - \frac{1}{8}x^4 \Big|_{x=1}^{x=2} = \frac{1}{4}2^4 \ln(2^2) - \frac{1}{4}1^4 \ln(1^2) - \left(\frac{1}{8}2^4 - \frac{1}{8}1^4\right) \\ &= 8 \ln(2) - 0 - \left(2 - \frac{1}{8}\right) = 8 \ln(2) - \frac{15}{8} . \end{aligned}$$

(ii)

$$\int_0^1 t^2 \exp(-t) dt ,$$

Lösung

Hier ist zweimalige partielle Integration vonnöten, um den Exponenten von t auf 0 zu bringen. Sei dazu $\dot{u}(t) = \exp(-t)$ und $v(t) = t^2$, dann gilt

$$u(t) = -\exp(-t) \quad \text{und} \quad \dot{v}(t) = 2t ,$$

also folgt

$$\int_0^1 t^2 \exp(-t) dt = -t^2 \exp(-t) \Big|_{t=0}^{t=1} - \int_0^1 -\exp(-t) \cdot 2t dt .$$

Im Integral integrieren wir abermals partiell mit $\dot{u}(t) = \exp(-t)$ und $v(t) = t$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \exp(-t) \cdot t dt &= -\exp(-t) \cdot t \Big|_{t=0}^{t=1} - \int_0^1 -\exp(-t) \cdot 1 dt \\ &= -\exp(-t) \cdot t \Big|_{t=0}^{t=1} - \exp(-t) \Big|_{t=0}^{t=1} . \end{aligned}$$

Insgesamt gilt dann

$$\begin{aligned}\int_0^1 t^2 \exp(-t) dt &= -t^2 \exp(-t) \Big|_{t=0}^{t=1} + 2 \int_0^1 \exp(-t) \cdot t dt \\ &= -t^2 \exp(-t) \Big|_{t=0}^{t=1} + 2 \left(-\exp(-t) \cdot t \Big|_{t=0}^{t=1} - \exp(-t) \Big|_{t=0}^{t=1} \right) \\ &= -(t^2 + 2t + 2) \exp(-t) \Big|_{t=0}^{t=1} = -5 \exp(-1) + 2.\end{aligned}$$

(iii)

$$\int_1^2 \sqrt{x} \ln(x) dx .$$

Lösung

Hier gehen wir wieder wie in (i) vor und setzen $v(x) = \ln(x)$ und $u'(x) = \sqrt{x}$. Dann ist

$$v'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{und} \quad u(x) = \frac{2}{3} x^{3/2}$$

und folglich

$$\begin{aligned}\int_1^2 \sqrt{x} \ln(x) dx &= \frac{2}{3} x^{3/2} \ln(x) \Big|_{x=1}^{x=2} - \int_1^2 \frac{2}{3} x^{3/2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{2}{3} x^{3/2} \ln(x) \Big|_{x=1}^{x=2} - \frac{2}{3} \int_1^2 x^{1/2} dx \\ &= \frac{2}{3} x^{3/2} \ln(x) \Big|_{x=1}^{x=2} - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \right) \Big|_{x=1}^{x=2} = \frac{2}{3} x^{3/2} \left(\ln(x) - \frac{2}{3} \right) \Big|_{x=1}^{x=2} \\ &= \frac{2}{3} \cdot 2^{3/2} \left(\ln(2) - \frac{2}{3} \right) + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \sqrt{2} \left(\ln(2) - \frac{2}{3} \right) + \frac{4}{9}.\end{aligned}$$

Aufgabe 2

Die physikalische Leistung L ist definiert als die momentane Abgabe von Energie pro Zeiteinheit. Sei $E(t)$ die gesamte bis zur Zeit t abgegebene Energie, dann ist also

$$L(t) = \dot{E}(t) \quad \text{bzw.} \quad E(t) = \int_0^t L(s) ds.$$

Nehmen wir nun an, dass die Leistung eines Marathonläufers gemäß der Formel

$$L(t) = \frac{1}{2 + \lambda t} \quad \text{mit } \lambda > 0$$

abnimmt. Wie groß ist dann die gesamte Energie, die er zum Zeitpunkt $t = 1$ abgegeben hat, also $E(1)$?

Lösung

Gesucht ist $E(1)$, genauer

$$E(1) = \int_0^1 L(s) ds = \int_0^1 \frac{1}{2 + \lambda s} ds.$$

Um das Integral zu berechnen, substituieren wir $\lambda s = \tau$ bzw. $s = \tau/\lambda = \varphi(\tau)$. Es gilt

$$\varphi'(\tau) = \frac{1}{\lambda}$$

und

$$\varphi : [0, \lambda] \rightarrow [0, 1]$$

Damit gilt dann mit der Substitutionsregel

$$\int_0^1 \frac{1}{2 + \lambda s} ds = \int_0^\lambda \frac{1}{2 + \tau} \cdot \frac{1}{\lambda} d\tau$$

Eine Stammfunktion von $\frac{1}{2+\tau}$ ist bekanntlich $\ln(2 + \tau)$ und es folgt

$$\int_0^1 \frac{1}{2 + \lambda s} ds = \frac{1}{\lambda} \ln(2 + \tau) \Big|_{\tau=0}^{\tau=\lambda} = \frac{1}{\lambda} (\ln(2 + \lambda) - \ln(2)).$$

Die zum Zeitpunkt $t = 1$ abgegebene Energie des Marathonläufers beträgt also $E(1) = \ln(2 + \lambda)/\lambda - \ln(2)/\lambda$.

Aufgabe 3

Eine Population entwickle sich gemäß der Differentialgleichung

$$\dot{x}(t) = -x(t) + (1 + \sin(t)), \quad x(0) = 1.$$

Man kann zeigen, dass sich die Lösung als

$$x(t) = \exp(-t) \left(1 + \int_0^t (1 + \sin(s)) \exp(s) ds \right)$$

schreiben lässt.

- (i) Berechnen Sie $\int_0^t \sin(s) \exp(s) ds$, indem Sie zweimal partiell integrieren.

Lösung

Sei also $u'(s) = \sin(s)$ und $v(s) = \exp(s)$, dann folgt mit partieller Integration

$$\begin{aligned} \int_0^t \sin(s) \exp(s) ds &= -\cos(s) \exp(s) \Big|_{s=0}^{s=t} + \int_0^t \cos(s) \exp(s) ds \\ &= -\cos(s) \exp(s) \Big|_{s=0}^{s=t} + (\sin(s) \exp(s)) \Big|_{s=0}^{s=t} - \int_0^t \sin(s) \exp(s) ds. \end{aligned}$$

Addieren wir auf beiden Seiten der Gleichung $\int_0^t \sin(s) \exp(s) ds$, so ergibt sich

$$\begin{aligned} 2 \int_0^t \sin(s) \exp(s) ds &= -\cos(s) \exp(s) + \sin(s) \exp(s) \Big|_{s=0}^{s=t} \\ &= -\cos(t) \exp(t) + \sin(t) \exp(t) + 1, \end{aligned}$$

und damit

$$\int_0^t \sin(s) \exp(s) ds = \frac{1}{2} \exp(t) (\sin(t) - \cos(t)) + \frac{1}{2}.$$

- (ii) Geben Sie mit Hilfe von (i) die Funktion $x(t)$ explizit an und zeigen Sie, dass die Differentialgleichung erfüllt ist.

Lösung

Benutzen wir die Tatsache, dass

$$\int_0^t \exp(s) ds = \exp(s) \Big|_{s=0}^{s=t} = \exp(t) - 1$$

gilt, so ergibt sich mit der angegebenen Formel für $x(t)$ und dem Ergebnis aus (i)

$$\begin{aligned} x(t) &= \exp(-t) \left(1 + \int_0^t (1 + \sin(s)) \exp(-s) ds \right) \\ &= \exp(-t) \left(1 + \exp(t) - 1 + \frac{1}{2} \exp(-t) (\sin(t) - \cos(t)) + \frac{1}{2} \right) \\ &= \exp(-t) \left(\exp(t) + \frac{1}{2} \exp(t) (\sin(t) - \cos(t)) + \frac{1}{2} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} (\sin(t) - \cos(t)) + \frac{1}{2} \exp(-t) \end{aligned}$$

Nun zeigen wir, dass $x(t)$ die Differentialgleichung erfüllt, dazu überprüfen wir zunächst die Anfangsbedingung

$$x(0) = 1 + \frac{1}{2} (\sin(0) - \cos(0)) + \frac{1}{2} \exp(-0) = 1 + \frac{1}{2} (0 - 1) + \frac{1}{2} \cdot 1 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Die Anfangsbedingung ist also erfüllt. Um die Differentialgleichung zu überprüfen, muss $x(t)$ differenziert werden:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \frac{1}{2} (\cos(t) + \sin(t)) - \frac{1}{2} \exp(-t) = -\left(1 + \frac{1}{2} (\sin(t) - \cos(t)) + \frac{1}{2} \exp(-t)\right) + 1 + \sin(t) \\ &= -x(t) + a + \sin(t), \end{aligned}$$

was zu beweisen war.

(iii) Skizzieren Sie $x(t)$. Welches Verhalten stellt sich langfristig ein ?

Lösung

Die Gestalt der Lösung kann folgender Abbildung entnommen werden:

Langfristig ist klar, dass $\exp(-t) \rightarrow 0$, die Lösung verhält sich also für große Werte von t wie

$$1 + \frac{1}{2} (\sin(t) - \cos(t)),$$

nimmt also keinen Grenzwert an, sondern schmiegt sich an obige Funktion an, welche auch in der Abbildung wiederzufinden ist.

Bemerkung: Dies kann nur bei sogenannten *nichtautonomen* Differentialgleichungen vorkommen, bei denen die rechte Seite explizit von t (hier $1 + \sin(t)$) abhängt. Die qualitative Analyse für Differentialgleichungen, die wir bisher studiert haben, funktioniert nur für autonome Differentialgleichungen, also Gleichungen vom Typ $\dot{x}(t) = f(x(t))$.