

## 7. Übung zu Mathematik für Biologen I

<http://www.mi.uni-koeln.de/~mkurth/biologie>

### Aufgabe 1

Der Blutalkoholspiegel  $B$  wird nach einem Modell in Abhängigkeit von der Zeit  $t$  durch die Funktion

$$B(t) = B_0 + B_1 \left( \frac{1}{1+at} - \frac{1}{1+bt} \right)$$

beschrieben. Dabei gelte für die Konstanten  $B_0, B_1 > 0$  und  $0 < a < b$ .

- (i) Welche Bedeutung hat  $B_0$ ?
- (ii) Wann ist der Blutalkoholspiegel maximal? Welcher Wert stellt sich langfristig ein?
- (iii) Fertigen Sie eine qualitative Skizze von  $B(t)$  an.

### Aufgabe 2

Eine Population entwickle sich gemäß der Verhulst-Gleichung

$$\dot{x}(t) = x(t)(2 - x(t)) \text{ mit } x(0) = x_0 > 0.$$

- (i) Bestimmen Sie die stationären Punkte  $\bar{x}$  der Gleichung, also die Lösungen mit  $x(t) = \bar{x}$ .
- (ii) Welches Monotonieverhalten besitzt  $x(t)$  ?
- (iii) Untersuchen Sie mit Hilfe der expliziten Lösung das Verhalten für  $t \rightarrow \infty$ .

### Aufgabe 3

Die Michaelis-Menten-Gleichung lässt sich auch als Differentialgleichung auffassen, wenn man die Konzentration des Substrats als Funktion  $x$  der Zeit  $t$  betrachtet. Die Umwandlungsgeschwindigkeit ist dann die Ableitung von  $x$  nach der Zeit, also  $\dot{x}(t)$ , und es gilt

$$\dot{x}(t) = \frac{Ax(t)}{k + x(t)} \text{ mit } x(0) = x_0 > 0.$$

Dabei sind  $A$  und  $k$  positive Konstanten.

- (i) Sei  $x(t)$  eine Funktion, die

$$\frac{k}{A} \ln \left( \frac{x(t)}{x_0} \right) + \frac{1}{A} (x(t) - x_0) = t \text{ für alle } t \geq 0$$

erfüllt. Zeigen Sie, dass  $x(t)$  eine Lösung der Differentialgleichung ist.

- (ii) Beantworten Sie durch Analyse der Differentialgleichung die folgenden Fragen:
  - Welches Monotonieverhalten besitzt  $x(t)$ ?
  - Welches Krümmungsverhalten besitzt  $x(t)$ ?
  - Was passiert für  $t \rightarrow \infty$ ?

Fertigen Sie anhand dieser Resultate eine qualitative Skizze von  $x(t)$  an.

**Abgabe in den jeweiligen Übungsstunden am 5.12.2002 bzw. 6.12.2002.**