Abgabe: Bis 04.07., 18 Uhr, in den Kästen in Raum 301 des Mathematischen Institutes

12. Übung Wahrscheinlichkeitstheorie I

($\mathcal{L}^p$ Räume, Normalverteilung, Kovarianz)

Blatt 11: Korrigierte Aufgabe: 11.3

Blatt 12: Vorzurechnende Aufgabe: 12.1

Dies ist das **letzte Übungsblatt**. Für die Zulassung müssen Sie **60 Punkte** erreichen.

Aufgabe 12.1

(10 Punkte)

Es seien $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ein Maßraum, $p \in (1, \infty]$, sowie $f, g \in \mathcal{L}^p$. Wir beweisen in dieser Aufgabe Theorem 3.4.5. Für die Aufgabenteile a) - c) nehmen wir $p \in (1, \infty)$ an.

a) Zeigen Sie $f + g \in \mathcal{L}^p$ und

$$\|f + g\|_p^p \leq \|f(f + g)^{p-1}\|_1 + \|g(f + g)^{p-1}\|_1. \quad (1 \text{ Punkt})$$

b) Es sei $q := \frac{p}{p-1}$. Zeigen Sie:

$$\|f + g\|_p^p \leq \|f\|_p \left(\int |f + g|^p d\mu \right)^{1/q} + \|g\|_p \left(\int |f + g|^p d\mu \right)^{1/q}. \quad (2 \text{ Punkte})$$

c) Zeigen Sie: $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$. (1 Punkt)

d) Angenommen $p = \infty$. Zeigen Sie: $f + g \in \mathcal{L}^\infty$ und $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$. (2 Punkte)

e) Angenommen $p = \infty$. Zeigen Sie, dass sowohl $\mu(|f| > \|f\|_\infty) = 0$, als auch $\mu(|f| \in [\|f\|_\infty - \varepsilon, \|f\|_\infty]) > 0$ für alle $\varepsilon > 0$ gilt. (2 Punkte)

f) Angenommen $f \in \mathcal{L}^\infty$ und μ ist endlich. Zeigen Sie:

$$\|f\|_p \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \|f\|_\infty. \quad (2 \text{ Punkte})$$

Aufgabe 12.2

(10 Punkte)

Es seien $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ein Maßraum, $p \in [1, \infty)$, sowie $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p$, $f \in \mathcal{L}^p$ derart, dass $f_n \rightarrow f$ μ -f.ü.

a) Angenommen $\|f_n - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Zeigen Sie: $\|f_n\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|f\|_p$. (1 Punkt)

b) Zeigen Sie $|f_n - f|^p \leq 2^p(|f_n|^p + |f|^p) =: h_n$. (1 Punkt)

c) Es sei h_n wie in b). Zeigen Sie:

$$\int 2^{p+1}|f|^p d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int h_n d\mu - \|f_n - f\|_p^p \right). \quad (3 \text{ Punkte})$$

d) Angenommen $\|f_n\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|f\|_p$. Zeigen Sie: $\|f_n - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. (3 Punkte)

e) Es seien nun $p = 1$, $f_n \geq 0$ μ -f.s. für alle $n \in \mathbb{N}$, $f \geq 0$ μ -f.s., $\nu_n := f_n \cdot \mu$, $\nu := f \cdot \mu$. Angenommen $\nu_n(\Omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \nu(\Omega)$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie

$$\|\nu_n - \nu\|_{\text{TV}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Bemerkung: Wir haben $\|\cdot\|_{\text{TV}}$ in Aufgabe 8.3 eingeführt. (2 Punkte)

Aufgabe 12.3

(10 Punkte)

Wir definieren $\mathcal{N}(0, \Sigma) := (f_\Sigma \cdot \lambda^2)$ die zweidimensionale zentrierte Normalverteilung, wobei $\Sigma = (\Sigma_{i,j})_{i,j \in \{1,2\}}$ eine symmetrische positiv definite Matrix ist und

$$f_\Sigma(x) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det(\Sigma)}} \exp\left(-\frac{1}{2}x^T \Sigma^{-1}x\right) \text{ für alle } x \in \mathbb{R}^2.$$

Wir erinnern, dass Σ invertierbar ist und eine eindeutige symmetrische positiv definite Matrix $\sqrt{\Sigma}$ existiert mit $(\sqrt{\Sigma})^2 = \Sigma$ und $(\sqrt{\Sigma})^{-1} = \sqrt{\Sigma^{-1}}$.

- Zeigen Sie, dass für jede symmetrische positiv definite Matrix A gilt: $\lambda^2 \circ A = \det(A) \cdot \lambda^2$. Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis benutzen, dass λ^2 das einzige Maß auf $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$ ist, sodass $\lambda^2(B+x) = \lambda^2(B)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ und $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ und $\lambda^2([0, 1]^2) = 1$. (2 Punkte)
- Es seien X' und Y' zwei unabhängige $\mathcal{N}(0, 1)$ -verteilte Zufallsvariablen (ZV), $Z' = (X', Y')$ und $Z = \sqrt{\Sigma}(Z')^T$. Zeigen Sie, dass Z eine $\mathcal{N}(0, \Sigma)$ -verteilte ZV ist. (3 Punkte)
- Es sei (X, Y) eine $\mathcal{N}(0, \Sigma)$ -verteilte Zufallsvariable. Zeigen Sie, dass X eine $\mathcal{N}(0, \Sigma_{1,1})$ -verteilte ZV ist, Y eine $\mathcal{N}(0, \Sigma_{2,2})$ -verteilte ZV ist, und $\text{Cov}(X, Y) = \Sigma_{1,2}$. (2 Punkte)
- Es sei (X, Y) eine $\mathcal{N}(0, \Sigma)$ -verteilte Zufallsvariable mit $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Zeigen Sie, dass X und Y unabhängig sind. (1 Punkt)
- Es sei X eine $\mathcal{N}(0, 1)$ -verteilte ZV, Z eine von X unabhängige ZV auf $\{-1, 1\}$ mit $\mathbb{P}(Z = 1) = \mathbb{P}(Z = -1) = \frac{1}{2}$ und $Y = XZ$. Zeigen Sie, dass X und Y $\mathcal{N}(0, 1)$ -verteilte ZV sind, aber keine symmetrische positiv definite Matrix Σ existiert, sodass (X, Y) eine $\mathcal{N}(0, \Sigma)$ -verteilte ZV ist. (2 Punkte)

Anmerkung: Sollten Sie für die Bearbeitung der Aufgaben mehrere Blätter benötigen, so sind diese zusammenzuheften. Bitte beschriften Sie Ihre Lösungen in der ersten Zeile in der folgenden Reihenfolge: **Gruppennummer in Rot**, Vorname, Name, Matrikelnummer, Blattnummer!